PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ

DO BAZÉNU

SAVO

MAXI Tablety komplex 3v1

dezinfekce / vločkování / odstranění řas

DEZINFEKCE

CZ Velké chlorové kombinované tablety pro celosezonní dezinfekci a údržbu bazénové vody. Přípravek zabraňuje množení mikroorganizmů v bazénové vodě a zajišťuje trvalé vločkování nečistot. Díky pozvolnému rozpouštění tablety dochází k postupnému uvolňování účinné látky (chloru), látky pro vločkování a voda je tak neustále mikrobiologicky kontrolována a kvalitně čištěna.

Dávkování: Orientačně – podle teploty vody a obsahu aktivního chloru přidávejte každých 6–8 dnů 1–2 tablety na 20–30 m³ vody. Tablety slouží k udržování stabilní hladiny volného chloru při vyhovující kvalitě vody, rozpouštějí se postupně a zároveň se volný chlor odbourává. Potřeba chloru pro zajištění optimálního množství aktivního chloru ve vodě se bude měnit v závislosti na teplotě vzduchu a vody, počtu koupajících, četnosti a intenzity dešťů a bouřek. Při dlouhodobě pěkném počasí, po bouřkách, při zvýšeném provozu bazénu a vyšší teplotě vody nárazově ošetřete přípravkem SAVO Chlor šok. K dočištění vody použijte SAVO Projasňovač.

Důležité: Pro správné používání přípravku je nezbytné používat testovací soupravu na měření hodnoty pH a aktivního chloru v bazénové vodě. Pokud je voda již vyčištěná, udržujte hladinu volného chloru v rozmezí 0,3–0,5 mg/l. Před prvním použitím chlorových tablet (po napuštění bazénu) proveďte vždy preventivní ošetření vody přípravkem SAVO Chlor šok, upravte hodnotu pH bazénové vody přípravky SAVO pH+ nebo SAVO pH– na 7,1–7,5.

Tablety lze přidávat: *Plovákem:* Do dávkovacího plováku vložte potřebné množství chlorových tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody a pomocí regulace na otvorech plováku nebo počtu současně použitých tablet udržujte doporučenou hodnotu aktivního chloru. *Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí:* Do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby přibližně byla dodržována doporučená hodnota aktivního chloru. **NIKDY NEVHAZUJTE TABLETY PŘÍMO DO BAZÉNU!** Používejte ochranné rukavice a brýle. Skladujte vždy v uzavřené nádobě na suchém a před přímým slunečním světlem chráněném místě při teplotách 5–25 °C a mimo dosah dětí. Při práci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. Nikdy nemíchejte s jinými přípravky.

První pomoc: *Při nadýchání:* odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. *Při styku s kůží:* odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou, mýdlem. *Při zasažení očí:* ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka, zajistit lékařskou pomoc. *Při požití:* vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, pokud možno podat aktivní uhlí v malém množství (1–2 rozdrcené tablety), zajistit rychlou lékařskou pomoc. Kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření: Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, Tel: 224 919 293, 224 915 402.

Účinná látka: trichlorisokyanurová kyselina (ES 201-782-8) 950 g/kg; další složka: síran hlinitý (ES 233-135-0).

Spotřebujte do: viz obal.

SK Velké chlórové kombinované tablety na celosezónnu dezinfekciu a údržbu bazénovej vody. Prípravok zabraňuje množeniu mikroorganizmov v bazénovej vode a zabezpečuje trvalé vločkovanie nečistôt. Vďaka pozvoľnému rozpúšťaniu tablety dochádza k postupnému uvoľňovaniu účinnej látky (chlóru), látky pre vločkovanie a voda je tak neustále mikrobiologicky kontrolovaná a kvalitne čistená.

Dávkovanie: Orientačne – podľa teploty vody a obsahu aktívneho chlóru pridávajte každých 6 – 8 dní 1 – 2 tablety na 20 – 30 m³ vody. Tablety sa používajú na udržiavanie stabilnej hladiny voľného chlóru pri vyhovujúcej kvalite vody, rozpúšťajú sa postupne a zároveň sa voľný chlór odbúrava. Potreba chlóru na zaistenie optimálneho množstva aktívneho chlóru vo vode sa bude meniť v závislosti od teploty vzduchu a vody, počtu kúpajúcich sa, frekvencie a intenzity dažďov a búrok. Pri dlhodobo peknom počasí, po búrkach, pri zvýšenej prevádzke bazéna a vyššej teplote vody nárazovo ošetrite prípravkom SAVO Chlór šok. Na dočistenie vody použite SAVO Rozjasňovač.

Dôležité: Pre správne používanie prípravku je nutné používať testovaciu súpravu na meranie hodnoty pH a aktívneho chlóru v bazénovej vode. Ak je už voda vyčistená, udržujte hladinu voľného chlóru v rozmedzí 0,3 – 0,5 mg/l. Pred prvým použitím chlórových tabliet (po napustení bazéna) vykonajte vždy preventívne ošetrenie vody prípravkom SAVO Chlór šok, upravte hodnotu pH bazénovej vody prípravkami SAVO pH+ alebo SAVO pH– na 7,1 – 7,5.

Tablety je možné pridávať: *Plavákom:* Do dávkovacieho plaváka vložte potrebné množstvo chlórových tabliet. Nechajte plavák, aby sa voľne pohyboval po hladine bazéna, kde je väčší pohyb vody a pomocou regulácie na otvoroch plaváka alebo počtu súčasne použitých tabliet udržiavajte odporúčanú hodnotu aktívneho chlóru. *Dávkovačom zabudovaným do cirkulačného potrubia:* Do dávkovača dajte potrebné množstvo tabliet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodržiavaná odporúčaná hodnota aktívneho chlóru. **NIKDY NEVHADZUJTE TABLETY PRIAMO DO BAZÉNA!** Používajte ochranné rukavice a okuliare. Skladujte vždy v uzavretej nádobe na suchom a pred priamym slnečným svetlom chránenom mieste pri teplotách 5 – 25 °C a mimo dosahu detí. Pri práci s prípravkom nefajčite, nejedzte a nepite. Nikdy nemiešajte s inými prípravkami.

Prvá pomoc: *Pri nadýchaní:* odstráňte zdroj expozície, zaistite postihnutému prívod čistého vzduchu, zabráňte fyzickej námahe (vrátane chôdze), popr. vyhľadajte lekársku pomoc. *Pri styku s pokožkou:* odstráňte zasiahnutý odev, zasiahnutú pokožku dostatočne umyte vodou, mydlom. *Pri zasiahnutí očí:* ihneď vymývajte min. 10 minút široko otvorené oči tečúcou vodou tak, aby sa voda dostala aj pod viečka, zaistite lekársku pomoc. *Pri požití:* vypláchnite ústa pitnou vodou, vypite 0,5 litra chladnej pitnej vody, nevyvolávajte vracanie, ak je to možné, podajte aktívne uhlie v malom množstve (1 – 2 rozdrvené tablety), zaistite rýchlu lekársku pomoc. V súvislosti s rozhodnutím o nutnosti lekárskeho ošetrenia kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum, tel.: +421 2 54 774 166.

Účinná látka: kyselina trichlórizokyanurová (ES 201-782-8) 950 g/kg; ďalšia zložka: síran hlinitý (ES 233-135-0).

Spotrebujte do: pozri obal.

1,4 kg

7x tableta 200 g

HDPE

Unilever

www.unilever.com

www.savo.eu

8 714100 178324

NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČENSTVO

CZ: Savo Tablety Komplex 3v1. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pozor! Nepoužívejte s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Obsahuje: trichlorisokyanurová kyselina; síran hlinitý **Distributor:** UNILEVER ČR, spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670, 186 00 Praha 8. ☎ 844 222 844, infolinka@unilever.com. Vyrobeno v Číně. Baleno v ČR.

SK: Savo Tablety Komplex 3v1. Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. POZOR! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu. Obsahuje: kyselina trichlórizokyanurová; síran hlinitý. **Distribútor:** Unilever Slovensko, spol. s r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, ☎ 0850 123 850, infolinka@unilever.com. Vyrobené v Číne. Balené v ČR. Reg. č.: pozri obal.

EXP : 20190425
71152BMA